دوز داروهای ترالی اورژانس

اپی نفرین

Cardiac arrest

1mg IV blus every 3-5 min

شوک آنافیلاکسی زیر جلدی

5mic g/min

شوک سپتیک 1-2mic g/min

وراپامیل

0.075- 0.15 mg/kg slow IV

حداکثر دوز ۲ آمپول 10mg

آدنوزین

تزریق سریع وریدی 6 mg

در صورت عدم تاثیر یک الی دو دقیقه بعد و دوز سوم 12mg و دوز بعدی 12 mg سریعا تزریق می گردد.

دیازپام

0.15 mg/kg

حتما IV مستقیم یا IM

بیکربنات سدیم

1 m Eq / dose slow IV

متوکلرو پرامید

10 mg / Slow IV 1-2 min

آمیوداورون

IV مستقیم فقط در احیا

300 mg IV Slow

انفوزیون 150 mg

طی ده دقیقه

۹۰۰ میلی گرم طی ۲۴ ساعت بعدی

پروپرانولول

1mg/min Slow IV

آتروپین

0.2 mg/kg

دوز برادیکاردی 0.6mg

کلسیم گلوکونات

درمان هایپوکلسمی ۱ تا ۲ گرم طی ۲ ساعت

فنی توئین

انفوزیون 20mg/kg

هپارین

۵۰۰۰ واحد هر ۴ ساعت در پیشگیری از DVT انفوزیون می شود.

فروزماید

IV آهسته همراه با کنترل فشارخون

20-40 mg IV / IM

نیترو گلیسیرین

5-10 mic /min

افزایش دوز هر ۱۰ دقیقه

دگزامتازون

0.4- 0.8 mg/kg/day IV

فنوباربیتال

15 mg/kg IV

هیدروکورتیزون

100mg Slow IV

دوبوتامین

3-20mg/kg/min

دوپامین

دوز کلیوی 3micg/kg

دوز قلبی 3-10mi g/kg

دوز هیپوتنشن 10mic/kg

لیدوکائین

انفوزیون 1-4mg/min

بلوس 1-1.5mg/kg

میدازولام

0.02 mg/kg

نالوکسان

0.4- 2 mg slow IV

سایمیتیدین

300 mg IV

نیتروپروساید

0.3- 0.5 mg/kg/min

طراحی: فاطمه رادمنش (دانشجوی هوشبری قزوین)

با نظارت: آیدا صفایی فخر (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین)